Los componentes de la terapia incluyen lo siguiente:

- El control de las pulgas es imperativo, porque las pulgas empeoran el problema, especialmente si el animal es alérgico a las pulgas.
- Los suplementos de ácidos grasos Omega-3 (DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico)) ayudan a reducir la inflamación de la piel, sin peligro y generalmente se administran junto con otras terapias.
- Los medicamentos para reducir la inflamación y controlar la comezón en perros y gatos con alergias comúnmente incluyen antihistamínicos, glucocorticoides, ciclosporina o oclacitinib.
- Hay muchas ventajas de terapias tópicas como champús, enjuagues, aerosoles y toallitas húmedas. Incluyen la eliminación de desechos y alérgenos de la piel. El tratamiento de infecciones secundarias bacterianas o de levadura/chicon con champús, aerosoles y toallitas terapéuticos puede ayudar a proporcionar un alivio inmediato al animal (algunos contienen medicamentos contra la comezón) y puede ayudar a reducir la necesidad de medicamentos orales o inyectables que pueden tener efectos secundarios no deseados. Algunas terapias tópicas también ayudan a reparar las funciones de barrera de la piel.
- Los medicamentos orales para tratar las infecciones bacterianas y de hongos están indicados cuando las terapias tópicas podrían no ser capaces remediar el problema con la suficiente rapidez o por completo.
- Las “vacunas contra la alergia” pueden formularse según los resultados de las pruebas de alergia. Una vez que usted y su veterinario saben a qué es alérgico su animal, se le preparan una serie de “vacunas contra la alergia” para su animal en función de esa información. Las “vacunas contra la alergia” entrenan al cuerpo de su animal para que no reaccione anormalmente al alérgeno (la sustancia a la que su animal es alérgico). Puede tomar hasta 9-12 meses para ver resultados beneficiosos.
- Algunos animales con atopia se benefician al cambiar a un alimento de mayor calidad, incluso si no tienen alergia a los alimentos.

Dechra Veterinary Products
7015 College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 66211
(866) 933-2472 / Fax: (913) 327-0016 / www.dechra-us.com

Dechra es una marca registrada de Dechra Pharmaceuticals PLC.

02CB-DEC50147-1018

Cuidado de regreso

Dermatitis atópica es una enfermedad por vida y requiere mantenimiento de tratamiento de largo plazo. Usted y su veterinario deben estar en contacto regularmente para identificar los tratamientos más efectivos para su animal. Frecuencia: cita de regreso, será necesario para asesorar los efectos de la terapia y asegurar positivos resultados, tanto con minimizar los brotes.

1. El tratamiento recomendado para su animal es: _____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Notifique al veterinario si: _____

_____

_____

_____

_____

_____

3. Fecha de cita de regresó: _____

_____

_____

_____

Informe a su veterinario si tiene dificultades con el tratamiento recomendado. Hay muchas opciones para ayudar a su animal y pueden diseñar un plan que se ajuste mejor a las necesidades de su animal.



ATOPIA

La dermatitis atópica (ay-top-ick dur-ma-tie-tiss) (También conocido como Atopia) es una enfermedad alérgica de la piel en perros y gatos. Al igual que las alergias humanas, es provocada por la exposición a alérgenos (sustancias que causan alergia) en el medio ambiente de su animal. Estos pueden ser pastos y pólenes de plantas, polvo de casa y ácaros del polvo doméstico, esporas de moho e incluso plumas. Los alérgenos causan reacciones al adherirse a la piel y ser absorbidos a través de la piel, lo que hace que el sistema inmune del animal reaccione a ese alergénico. Esta extremadamente reacción común de enfermedad alergénico de la piel, es segunda únicamente después de la reacción de dermatitis alérgia de pulgas en frecuencia y es incurable. Atopia afecta al 10 por ciento de perros y es genéticamente hereditaria, una enfermedad de comezón recurrente de la piel que comienza entre los 1 a 3 años de edad. Los gatos también parecen tener un componente genético y historia familiar. La mayoría de los gatos (> 75% de los casos) desarrollarán signos clínicos entre los 6-24 meses de edad.

Dechra
Veterinary Products

Signos Clínicos

Los signos ocurren durante una temporada específica de polen o durante todo el año, dependiendo de a qué es alérgico el animal. En las primeras etapas de atopía canina, las comezones suelen ser estacional y la piel se ve normal. El pero se rascan las orejas y las partes inferior de su cuerpo. Las comezones a Menudo, se le acompaña por frotarse la cara, estornudar, goteo nasal, ojos llorosos y lamerse las patas (que generalmente deja manchas o marrones en los pies).

Si la enfermedad progresa, la piel de su animal puede volverse extremadamente picante, roja, escamosa e irritada. Se desarrolla un ciclo de comezones -rascaos y comezones con profundos arañazos de la piel, pérdida de cabello, costras, roña y una infección secundaria de la piel. Si puede imaginarse una caso severo y crónico de hiedra venenosa severa, empezará a comprender porque los animales afectados de atopia experiencia falta de pelo a causea de rascarse, frotarse y lamerse. Con el tiempo, la piel se vuelve gruesa y pigmentada oscuramente. Piel escamosa a menudo se desarrolla junto con la infección de la piel.

Alergias y Paciente Atópico



En los gatos, el signo común y consistente es comezón localizada en la cara y el cuello. Subsecuente, perdida de pelo ocurre, y varios gatos llegan a parecer y desarrollar heridas, rasguños y chichones/protuberancias elevadas en sus cuerpos, principalmente- alrededor de la cabeza, el cuello y debajo del cuerpo.

En ambos perros y gatos, las infecciones de oído pueden acompañar estos signos. Pabellón de la oreja pueden estar rojas e inflamadas y los canales se llenan con una cera marrón que eventualmente causa infecciones bacterianas o de hongos.

Diagnóstico

La atopia, especialmente cuando se es complicada por medio de una infección de la piel, puede ser difícil de distinguir contra otras enfermedades de la piel. El diagnóstico puede ser (sospechado) identificado y confirmado a base de la historia, locales de las lesiones en la piel y la frecuencia de ocurrencia estacional. Pruebas que incluyen, raspados de piel, cultivos bacterianos y fúngicos, biopsias de la piel y una prueba hipoalergénica de dieta, deben ser considerada antes de descartar y embarcar a otras causas de comezón tanto como, iniciar un curso de tratamiento más involucrado o diagnósticos más intensos para la atopia. Es importante tratar eliminar las pulgas. La mayoría de los perros y gatos con atopia son alérgicos a las pulgas y pueden tener dermatitis asociada con la alergia de las pulgas que confunde lo presente. Algunas veces, en ciertas áreas, tratamientos orales de pulgas mensualmente, no son suficientes para estos animales.

Pruebas de alergia pueden confirmar el diagnóstico de atopia y pueden ser tomadas por medio de mediante cutáneas intradérmicas o pruebas de sangre. Ambas pruebas tienen un cierto nivel de inexactitud asociada a ellas. Sin embargo, las pruebas pueden ayudar a determinar a qué es alérgico el animal y ayudar en el tratamiento para controlar los síntomas.

Tratamiento

La solución más efectiva a largo plazo es cambiar las circunstancias de vida del animal para evitar el alérgeno. El animal atópico suele ser alérgica a muchos alérgenos diferentes, Sin embargo, y a menudo, no es posible evitar la exposición asea ellos. O quizás no sepa usted qué desencadena las alergias de su perro o gato.

Ya que evita exposición de los alérgenos frecuentemente no es posible, el tratamiento está diseñado para que el animal se sienta más cómoda. No es posible curar la alergia ambiental, pero afortunadamente, la mayoría de los animales con atopia responden bien al tratamiento. Uno de los primeros y más importantes pasos es reducir posibilidad de comezón por medio de tratamiento y eliminado todo asociado problema irritante de la piel, como las pulgas, la descamación de la piel y la infección.

Dechra 24 horas soporte técnico de veterinario:
(866) 933-2472, www.dechra-us.com, support@dechra.com